

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 469

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

85,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 19 du 14 JUIN 1982 (ÉDITION GÉNÉRALE)

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Les récentes pluies du 10 au 14, parfois très importantes, peuvent être à l'origine de contaminations graves (les émissions d'ascospores n'étant pas encore terminées).

Il y a lieu d'assurer une protection soignée dès réception de cette note

OIDIUM DU POMMIER

Intervenir en même temps contre ce champignon.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Il est nécessaire de renouveler le traitement contre ce ravageur (bulletin n° 17 du 3 Juin) s'il a été lessivé par les dernières pluies (+ 25 mm).

PSYLLE DU POIRIER

Lieu d'intervenir.

Dans les vergers habituellement atteints, il y a

TUDY, MAITAC) ou de monocrotophos (AZODRIN, NUVACRON).

Utiliser de préférence un produit à base d'amitrazé

Ces produits ont une faible action sur la faune auxiliaire.

BACTERIOSE DU NOYER

Un traitement à base de cuivre est conseillé dans les prochains jours (150 g de cuivre métal par hl d'eau soit 300 g d'une spécialité commerciale titrant 50 % de cuivre).

CARPOCAPSE DES NOIX

Intervenir en même temps en ajoutant un insecticide à la bouillie.

Intervenir en même temps en ajoutant un insecti-

P. 202

V I G N E

MILDIOU

De nouvelles taches ont été découvertes dans les régions de CONTIGNY et FLEURIEL le 10 Juin.

Le traitement conseillé dans notre dernier bulletin doit être soigné afin d'éviter les repiquages.

BLACK-ROT

Les premières taches sont apparues le 10 Juin dans les régions de CONTIGNY et SAINT-POURÇAIN-s/SIOULE.

Si ces taches sont observées dans certains vignobles (taches rouge brique avec pycnides), il y a lieu d'utiliser dans les traitements ultérieurs des produits à base de cuivre, captafol, captane, folpel, dichlofluanide, mancozèbe, manèbe, propinèbe ou zinèbe.

* RECTIFICATIF

Dans le tableau sur les caractéristiques des techniques des spécialités autorisées contre le mildiou de la vigne, bulletin n° 11 du 29 Avril 1982, il y a lieu de mettre dans la rubrique :

fongicide à base de phoséthyl AL (15 jours au lieu de 60 jours concernant les délais d'emploi avant récolte).

* * * * *

* * * * *

* * * * *